

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

ノーリツZ DX(滋養強壮薬)

使用上の注意[相談すること] 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること／皮膚：発疹／消化器：吐き気・嘔吐・胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること／軟便、下痢 3.しばらく服用しても症状がよくなりません場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること **成分・分量** 1日量(100mL)中

ベンフォチアミン(ビタミンB₁誘導体)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)12mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)50mg、ニコチン酸アミド60mg、無水カフェイン50mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン10mg、タウリン3,000mg、ケイヒ流エキス0.1mL(原生薬換算量100mg)、トウキ流エキス0.1mL(原生薬換算量100mg) 添加物：液糖、D-ソルビトール、pH調節剤(クエン酸)、安息香酸Na、香料(バニリン、エチルバニリン、エタノール、ブロピレングリコール、フェノール類)(アルコール0.2mL以下)●ビタミンB₂により尿が黄色くなることがある。

効能・効果 ○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

**タウリン3000mg
ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン
ケイヒ流エキス・トウキ流エキス
ベンフォチアミン(ビタミンB₁誘導体)**

**滋養強壮、虚弱体質
肉体疲労時の栄養補給**

**ノーリツZ
DX**

第3類医薬品

常盤薬品
NOEVIR GROUP

用法・用量 成人(15才以上)1日1回、1びん(100mL)を服用すること。●用法・用量を守ること。
保管および取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

100mL 260円(税別)

製造販売元

常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12
NOEVIR GROUP

お問い合わせは0120-875-710まで
www.kusuribako.jp

副作用被害救済制度 0120-149-931

金属：キャップ
ガラス：びん

使用期限

製造番号

002520
ALI501

JAN作成してください。
4987156 005577