

第3類医薬品

42錠

ここからお切りください。開封後はチャックを閉じて保管してください。

南天のど飴P（せき止め薬）

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。
必要ときに読めるように、大切に保管してください。

使用上の注意【してはいけないこと】（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください／他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など）**【相談すること】** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください（1）医師の治療を受けている人。（2）妊婦または妊娠していると思われる人。（3）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。（4）次の症状のある人。高熱 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください 3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください **効能・効果** せき、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ **用法・用量** 食間に服用してください。左表の1回量を1錠ずつ口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。なお、1回分を服用後は、2時間以上の間隔をおいて服用してください。＜用法・用量に関連する注意＞（1）用法・用量を厳守してください。（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。**成分・分量** 1日量（9錠）中 南天実乾燥エキス500mg 添加物：白糖、水アメ、ハチミツ、クエン酸、L-メントール、アラビアゴム、カラメル、タルク、カルナウバロウ、香料（エタノール、

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
8才以上15才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満	服用しないでください。	

プロピレングリコール）**保管および取扱い上の注意**（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。（2）小児の手のとどかない所に保管してください。（3）品質を保持するため、開封後はチャックを閉じて保管してください。（4）期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元

常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12

お問い合わせは

常盤薬品工業株式会社

お客さま相談室0120-875-710まで

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

南天のど飴のブランドサイトはこちら <http://nodoame.jp>

副作用被害救済制度

0120-149-931

1錠あたり7kcal

使用
期限

製造
番号



PE, 金属



4987156 21249 4

067515
TISD801