

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

ローヤルゴールドS (滋養強壮薬)

使用上の注意[相談すること] 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること/皮ふ：発疹/消化器：胃部不快感・下痢
2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること 成分・分量
1日量(50mL)中 チアミン硝化物(ビタミンB1) 10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)15mg、ニコチン酸アミド50mg、無水カフェイン50mg、タウリン1,000mg、ニンジンエキス40.3mg(原生薬換算量600mg)、エゾウコギエキス50mg(原生薬換算量1,000mg)、イカリソウ流エキス0.5mL(原生薬換算量500mg)、ローヤルゼリーチンキ100mg、ロクジョウチンキ0.1mL(原生薬換算量28.6mg)、ハンピチンキ0.3mL(原生薬換算量60mg)
添加物：pH調節剤(クエン酸)、安息香酸Na、液糖、D-ソルビトール、香料(バニリン、エチルバニリン、エタノール、プロピレングリコール、安息香酸ベンジル)(アルコール0.4mL以下)
●ビタミンB2により尿が黄色くなることがある。
効能・効果 ○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
用法・用量 成人(15才以上)1日1回、1びん(50mL)を服用すること。●用法・用量を守ること。

滋養強壮 虚弱体質



第2類医薬品

常盤薬品

NOEVIR GROUP

保管および取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

50mL 500円(税別)

金属：キャップ
ガラス：びん

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1
製造販売元 三重県伊賀市白樫字永谷2604-5


お問い合わせは
0120-875-710まで

副作用被害救済制度
0120-149-931

039610
KSB602

使用期限

製造番号



4