

《日本薬局方センブリ末》  
トチモトの  
センブリ末P  
内容量 500g

【使用上の注意】裏面をよくお読み下さい。

【成分及び分量又は本質】

1日量 (0.9g) 中 日本薬局方センブリ末0.9g

【効能又は効果】

〈健胃の目的で用いる場合〉胃弱、食欲不振、胃部・腹部  
膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき  
〈止瀉の目的で用いる場合〉

下痢、消化不良による下痢、くだり腹、軟便

【用法及び用量】

〈健胃の目的で用いる場合〉大人 (15歳以上) は1回量  
0.015g、1日3回、食前または食間に服用して下さい。

〈止瀉の目的で用いる場合〉大人 (15歳以上) は1回量  
0.3g、1日3回を限度とし服用して下さい。服用間隔  
は4時間以上おいてください。(添付のさじ1杯0.015g)  
・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。

医薬品



4 987466 127150

## 【使用上の注意】

### 相談すること

次の場合は、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。

- しばらく服用しても症状がよくなる場合

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり品質が変わるため)
- (4) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に使用したり、食べたりしないようご注意ください。

◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

株式会社 **杉本天海堂**

大阪市北区末広町3番21号

TEL 06 (6312) 8425



センブリ末

日本薬局方

日本薬局方

センブリ末

TOCHIMOTO

50g

センブリ末

日本薬局方

センブリ末

日本薬局方

日本薬局方  
**センブリ末**

医薬品

相談すること

次の場合は、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。

・しばらく服用しても症状の改善がみられない場合

〔効能・効果〕

〈健胃の目的で用いる場合〉胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき  
〈止瀉の目的で用いる場合〉下痢、消化不良による下痢、  
くだり腹、軟便

〔用法・用量〕

〈健胃の目的で用いる場合〉大人（15歳以上）は1回  
量0.015g、1日3回、食前または食間に服用して下さい。  
（添付のサジ1杯約0.015g）

〈止瀉の目的で用いる場合〉大人（15歳以上）は1回  
量0.3g、1日3回を限度とし服用して下さい。服用間隔  
は4時間以上あけて下さい。

・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。  
（誤用の原因になったり品質が変わるため）

**TOCHIMOTO**

株式会社 杉本天海堂

大阪市北区末広町3番21号

TEL 06 (6312) 8425

7 91721 997486



**センブリ末**

日本薬局方