

第3類医薬品

日本薬局方 ジュウヤク トチモトのジュウヤクP 十薬 (日本産・寸切) 500g



4 987466 123077

製造番号

使用期限

相談すること

【使用上の注意】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

便秘、尿量減少、便秘に伴う吹出物

【用法・用量】

大人(15歳以上)は1日量12gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服してください。
・定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

株式会社 橋本天海堂

[脱酸素剤入]

大阪市北区末広町 3 番21号 TEL 06(7711)0730

911210

第3類医薬品

日本薬局方 ジュウヤク トチモトのジュウヤクP 十薬 (日本産・寸切) 150g



4 987466 123091

製造番号

使用期限

相談すること

【使用上の注意】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

便秘、尿量減少、便秘に伴う吹出物

【用法・用量】

大人(15歳以上)は1日量12gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服してください。
・定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

株式会社 杉本天海堂

[脱酸素剤入]

大阪市北区末広町 3 番21号 TEL 06(7711)0730

911213