

第②類医薬品

日本薬局方 センナ トチモトのセンナP



(刻) 500g
製造番号
使用期限

【使用上の注意】

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。他の瀉下剤(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

2. 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
ひ ふ 皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、 はげしい腹痛をとまなう下痢

3. 服用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢、腹痛
4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：吹出物、のぼせ、痔

【用法・用量】

大人(15歳以上)は1日量3～6gに熱湯約150mlを加え、15分間煮た後に滓をこして取り、なるべく就寝前1回に服用してください。

・定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

株式会社 杉本天海堂

【脱酸素剤入】

大阪市北区末広町3番21号 TEL 06(7711)0730

913220