

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

生薬便秘薬

トチモトの
センナ実末

50g

センナの原産地はアフリカですが、今ではアラビアからインド（チンネベリー地方）で多く栽培されています。センナは欧米諸国で昔から緩下薬として使用されてきましたが、日本とはセンナの薬用部位が異なり、葉部ではなく、果実部が主として使用されてきました。これは「中薬大辞典」でも説明されていますが「両方の効能は同じであるが、服用後に起こる腹痛は葉よりも果実の方が穏やかである。」とされているからです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下剤（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
ひ 膚 皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、はげしい腹痛をともなう下痢

3. 服用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢、腹痛
4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量】

本品1日量（0.7g）中、センナ実末 0.7g

【効能・効果】

便秘。便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

【用法・用量】

大人（15歳以上）は1回0.4～0.7g、1日1回就寝前又は空腹時に服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

11歳以上15歳未満：0.3～0.4g

7歳以上11歳未満：0.2～0.3g

3歳以上 7歳未満：0.15～0.2gを服用してください。

（添付のさじ1杯約0.1g）

用法・用量に関連する注意 用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
品質には細心の注意を払っておりますが、お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

【お客様相談窓口】

株式会社 栃本天海堂 品質保証部・品質保証課

TEL 06-7711-0730

受付時間 10時～17時（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電 話 0120-149-931(フリーダイヤル)