

第②類医薬品

《日本薬局方センナ末》
トチモトの
センナ末^P
内容量 500g

【使用上の注意】裏面をよくお読み下さい。

【成分及び分量又は本質】

1日量 (0.5g) 中 日本薬局方センナ末0.5g

【効能又は効果】便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：吹出物、のぼせ、痔

【用法及び用量】大人（15歳以上）は1日1回、0.2
～0.5gをなるべく就寝前に服用して下さい。
（添付のさじ1杯約0.35g）

・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。



4 987466 127099

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下剤(下剤)
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

2. 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
ひふ 皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、はげしい腹痛をともなう下痢

3. 服用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢、腹痛
4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

- ◎ 品質には細心の注意をはらっておりますが、お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

[脱酸素剤入]

製造番号

使用期限

株式会社 標本天海堂

913224

1

大阪市北区末広町3番21号 TEL 06(7711)0730