

第3類医薬品

《日本薬局方ヨクイニン末》

トチモトの

ヨクイニン末_P

内容量 500g

【使用上の注意】裏面をよくお読み下さい。

【成分及び分量又は本質】

1日量（6g）中 日本薬局方ヨクイニン末6g

【効能又は効果】いぼ、皮膚のあれ

【用法及び用量】大人（15歳以上）は1回量2g、

1日3回、食前または食間に服用して下さい。

（添付のさじ1杯約2g）

・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。



4 987466 179036

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸の弱い人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- ◎ 品質には細心の注意をはらっておりますが、お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。 [脱酸素剤入]

製造番号

使用期限

株式会社 橋本天海堂