

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

医薬品

トチモトの 加味逍遙散

か み しょう よう さん

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1カ月位服用しても症状がよくならない場合
- 3.長期連用する場合には、医師又は薬剤師にご相談下さい。
- 4.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談下さい。 下痢

【成分・分量】 1日量（1包・23.0g中）

日本薬局方カンゾウ	2.0g	日本薬局方ショウキョウ	1.0g	日本薬局方ビャクジュツ	3.0g
日本薬局方サ イ コ	3.0g	日本薬局方ト ウ キ	3.0g	日本薬局方ブ ク リ ョ ウ	3.0g
日本薬局方サンシシ	2.0g	日本薬局方ハ ッ カ	1.0g	日本薬局方ボ タ ン ビ	2.0g
日本薬局方シャクヤク	3.0g				

【効能・効果】 体質虚弱な婦人で、肩がこり、疲れやすく、精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のある次の諸症：冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症

【用法・用量】

大人（15歳以上）本品1日1包を紙袋入りのまま、水約500mlを加え、半量ぐらいまで煎じつめ、紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用して下さい。

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- 15歳未満の小児には服用させないで下さい。
- 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこして下さい。
- 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分まとめて煎じないで下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わるため）
- 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用して下さい。
- 生薬を原料として製造しているので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。
- 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。

◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

【お問い合わせ先】

株式会社 栃本天海堂 DI室
電話番号:06(6372)6395
受付時間:9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

TOCHIMOTO
株式会社 栃本天海堂
大阪市北区末広町3番21号