

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

医薬品

トチモトの五苓湯

ご れい とう

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1カ月位（急性胃腸炎に服用する場合には5～6回、水瀉性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合

【成分・分量】 1日量（1包・22.5g中）

日本薬局方 タクシャ 6.0g 日本薬局方 ブクリョウ 4.5g 日本薬局方 ケ イ ヒ 3.0g
日本薬局方 チョレイ 4.5g 日本薬局方 ビャクジュツ 4.5g

【効能・効果】

のどが渇いて、尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいづれかを伴う次の諸症
水瀉性下痢、急性胃腸炎（しづり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ

【用法・用量】

大人1日1包を水500mlを加えてせんじ、250mlにし、そのせん液を1日3回に分けて食間（空腹時）に温服して下さい。

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- 15歳未満の小児には服用させないで下さい。
- 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこして下さい。
- 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分まとめて煎じないで下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わるため）
- 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用して下さい。
- 生薬を原料として製造しているので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。
- 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。

◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

【お問い合わせ先】

株式会社 栃本天海堂 DI室
電話番号:06(6372)6395
受付時間:9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

TOCHIMOTO
株式会社 栃本天海堂
大阪市北区末広町3番21号