

医薬品

トチモトの 柴胡加竜骨牡蛎湯

さい こ か りゅう こつ ぼ れい とう



使用上の注意



してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなるため)
- 次の人は服用しないで下さい。 生後3ヵ月未満の乳児
 - 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の医薬品を服用している人。 瀉下薬（下剤）
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。

- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

【成分・分量】 1日量（1包・29.5g中）

日本薬局方 サ イ コ	5.0g	日本薬局方 ケ イ ヒ	3.0g	日本薬局方 ニンジン	2.5g	日本薬局方 ショウキョウ	1.0g
日本薬局方 ハ ン ゲ	4.0g	日本薬局方 オウゴン	2.5g	日本薬局方 ボ レ イ	2.5g	日本薬局方 ダイオウ	1.0g
日本薬局方 ブクリョウ	3.0g	日本薬局方 タイソウ	2.5g	日本薬局方 リュウコツ	2.5g		

【効能・効果】

精神不安があつて、どうき、不眠などを伴う次の諸症
高血圧の随伴症状（どうき、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜なき

【用法・用量】

大人1日1包を水600mlを加えてせんじ、300mlにし、そのせん液を1日3回に分けて食間（空腹時）に温服して下さい。

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、医師又は薬剤師にご相談のうえ、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 1歳未満の乳児には、止むを得ない場合の他は、服用させないで下さい。
- 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこして下さい。
- 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分まとめて煎じないで下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わるため）
- 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用して下さい。
- 生薬を原料として製造しているので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。
- 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。

◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

【お問い合わせ先】

株式会社 栃本天海堂 DI室
電話番号:06(6372)6395
受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)