

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

医薬品

トチモトの 柴胡桂枝湯

さい こ けい し とう

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

2. 1ヵ月位（かぜの場合は1週間位）服用しても症状の改善がみられない場合
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師にご相談下さい。

【成分・分量】 1日量（1包・22.5g中）

日本薬局方サイコ	5.0g	日本薬局方シャクヤク	2.5g	日本薬局方タイソウ	2.0g
日本薬局方ハンゲ	4.0g	日本薬局方オウゴン	2.0g	日本薬局方カンソウ	1.5g
日本薬局方ケイヒ	2.5g	日本薬局方ニンジン	2.0g	日本薬局方ショウキョウ	1.0g

【効能・効果】 多くは腹痛を伴う胃腸炎、微熱、寒け、頭痛、はき気などのある感冒、風邪の後期症状

【用法・用量】

大人1日1包を水600mlを加えてせんじ 300mlにし、そのせん液を1日3回に分けて食間（空腹時）に服用して下さい。

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- 15歳未満の小児には服用させないで下さい。
- 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこして下さい。
- 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分まとめて煎じないで下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わるため）
- 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用して下さい。
- 生薬を原料として製造しているので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。
- 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意下さい。

◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

【お問い合わせ先】

株式会社 栃本天海堂 DI室
電話番号:06(6372)6395
受付時間:9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

TOCHIMOTO
株式会社 栃本天海堂
大阪市北区末広町3番21号