

医薬品

トチモトの小柴胡湯

しょう さい こ とう

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 肝臓病、高血圧、心臓病、腎臓病
 - インターフェロン製剤で治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- （2）1ヵ月位（風邪の後期の症状に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなりえない場合
- 3.長期連用する場合には、医師又は薬剤師にご相談下さい。

【成分・分量】 1日量（1包・24.0g中）

日本薬局方サ イ コ	7.0g	日本薬局方オウゴン	3.0g	日本薬局方ニンジン	3.0g
日本薬局方ハ ン ゲ	5.0g	日本薬局方タイソウ	3.0g	日本薬局方カンゾウ	2.0g
日本薬局方ショウキョウ	1.0g				

【効能・効果】 はきけ、食欲不振、胃炎、胃腸虚弱、疲労感および風邪の後期症状

【用法・用量】

大人1日1包に水500mlを加えてせんじ、250mlにし、そのせん液を1日3回に分けて食間（空腹時）に温服して下さい。

- （1）定められた用法・用量を厳守して下さい。
- （2）15歳未満の小児には服用させないで下さい。
- （3）煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこして下さい。
- （4）本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分まとめて煎じないで下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- （2）小児の手の届かない所に保管して下さい。
- （3）他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わるため）
- （4）煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用して下さい。
- （5）生薬を原料として製造しているので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。
- （6）本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。

◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

【お問い合わせ先】

株式会社 栃本天海堂 DI室
電話番号:06(6372)6395
受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

TOCHIMOTO
株式会社 栃本天海堂
大阪市北区末広町3番21号