

医薬品

トチモトの消風散

しょうふうさん

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなるため)
次の人は服用しないで下さい。 生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合
- 3.長期連用する場合には、医師又は薬剤師にご相談下さい。
- 4.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談下さい。 下痢
- 5.本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談下さい。

【成分・分量】 1日量(1包・24.0g中)

日本薬局方 カンゾウ 1.0g	日本薬局方 セッコウ 3.0g	日本薬局方 ト ウ キ 3.0g	日本薬局方 ゴボウシ 2.0g
日本薬局方 ク ジ ン 1.0g	日本薬局方 ソウジュツ 2.0g	日本薬局方 ボウフウ 2.0g	ゴ マ 1.5g
日本薬局方 ケイガイ 1.0g	日本薬局方 チ モ 1.5g	日本薬局方 モクツウ 2.0g	局 外 生 規 センタイ 1.0g
日本薬局方 ジ オ ウ 3.0g			

【効能・効果】 慢性湿疹(分泌物の多いもの)

【用法・用量】 大人(15歳以上)本品1日1包を紙袋入りのまま、水約500mlを加え、半量ぐらいまで煎じつめ、紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用して下さい。

15歳未満	7歳以上	大人の2/3	4歳未満	2歳以上	大人の1/3
7歳未満	4歳以上	大人の1/2	2歳未満		大人の1/4以下を服用する。

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 1歳未満の乳児には、止むを得ない場合の他は、服用させないで下さい。
- 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこして下さい。
- 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分まとめて煎じないで下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わるため)
- 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用して下さい。
- 生薬を原料として製造しているので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。
- 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意下さい。

◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

【お問い合わせ先】

株式会社 栃本天海堂 DI室
電話番号:06(6372)6395
受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

TOCHIMOTO
株式会社 栃本天海堂
大阪市北区末広町3番21号