

医薬品

トチモトの大柴胡湯

だい さい こ とう

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなるため)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。 他の瀉下薬（下剤）
- 2.授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。

- (2) 1カ月位（常習便秘、高血圧に伴う便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合
- 3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談下さい。 下痢

【成分・分量】 1日量（1包・24.0g中）

日本薬局方サ イ コ	6.0g	日本薬局方シャクヤク	3.0g	日本薬局方ショウキョウ	2.0g
日本薬局方ハ ン ゲ	4.0g	日本薬局方タイソウ	3.0g	日本薬局方ダイオウ	1.0g
日本薬局方オウゴン	3.0g	日本薬局方キ ジ ツ	2.0g		

【効能・効果】

がっちりとした体格で比較的体力があり、便秘の傾向のあるものの次の諸症：胃炎、常習便秘、高血圧に伴う肩こり・頭痛・便秘、肩こり、肥胖症

【用法・用量】

大人1日1包を水600mlを加えてせんじ、300mlにし、そのせん液を1日3回に分けて食間（空腹時）に服用して下さい。

- (1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 15歳未満の小児には服用させないで下さい。
- (3) 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこして下さい。
- (4) 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分まとめて煎じないで下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わるため）
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用して下さい。
- (5) 生薬を原料として製造しているので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。
- (6) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。

◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

【お問い合わせ先】

株式会社 栃本天海堂 DI室
電話番号:06(6372)6395
受付時間:9時から17時まで（土、日、祝日を除く）