

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

医薬品

トチモトの 半 夏 厚 朴 湯

はん げ こう ぼく とう

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

【成分・分量】 1日量(1包・17.5g中)

日本薬局方 ハ ン ゲ 6.0g 日本薬局方 コ ウ ボ ク 3.0g 日本薬局方 ソ ヨ ウ 2.0g
日本薬局方 ブクリョウ 5.0g 日本薬局方 ショウキョウ 1.5g

【効能・効果】

気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、時に動き、めまい、嘔気などを伴う次の諸症
不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声

【用法・用量】

- 大人1日1包を水500mlでせんじ、250mlとし、そのせん液を3回に分け、食間(空腹時)に服用して下さい。
- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
 - 15歳未満の小児には服用させないで下さい。
 - 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこして下さい。
 - 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分まとめて煎じないで下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わるため)
- 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用して下さい。
- 生薬を原料として製造しているので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。
- 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意下さい。

◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

【お問い合わせ先】

株式会社 栃本天海堂 DI室
電話番号:06(6372)6395
受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

TOCHIMOTO
株式会社 栃本天海堂
大阪市北区末広町3番21号