

医薬品

トチモトの 薏 苡 仁 湯

よく い にん とう



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなるため)
次の人は服用しないで下さい。 生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人。(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなりません

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師にご相談下さい。

【成分・分量】 1日量(1包・28.0g中)

日本薬局方 カンゾウ 2.0g 日本薬局方 シャクヤク 3.0g 日本薬局方 ト ウ キ 4.0g 日本薬局方 ヨクイニン 8.0g
日本薬局方 ケ イ ヒ 3.0g 日本薬局方 ソウジュツ 4.0g 日本薬局方 マ オ ウ 4.0g

【効能・効果】 関節痛、筋肉痛

【用法・用量】

大人(15歳以上):本品1日1包を紙袋入りのまま、水約500mlを加え、弱火で半量ぐらいまで煮つめた後、紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食前又は食間に服用して下さい。

15歳未満 7歳以上 大人の2/3 4歳未満 2歳以上 大人の1/3
7歳未満 4歳以上 大人の1/2 2歳未満 大人の1/4以下を服用する。

- (1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 1歳未満の乳児には、止むを得ない場合の他は、服用させないで下さい。
- (4) 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこして下さい。
- (5) 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分まとめて煎じないで下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わるため)
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用して下さい。
- (5) 生薬を原料として製造しているので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。
- (6) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意下さい。

◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

【お問い合わせ先】

株式会社 栃本天海堂 DI室
電話番号:06(6372)6395
受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

TOCHIMOTO
株式会社 栃本天海堂
大阪府北区末広町3番21号