



シシトフ

日本薬局方

日本薬局方

シシトフ



12g×32包

徳用
ティ・バッグ

日本薬局方



〔使用上の注意〕

相談すること

次の場合は、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。

・しばらく服用しても症状の改善がみられない場合

〔効能・効果〕

便秘、尿量減少、便秘に伴う吹出物

〔用法・用量〕

大人（15歳以上）は1日1包を、水約600mlをもって煮て、約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前又は食間3回に分服して下さい。

・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。

（誤用の原因になったり品質が変わるため）

(4) 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管して下さい。

(5) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。

◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

医薬品

TOCHIMOTO

株式会社 杉本天海堂

大阪市北区末広町3番21号

TEL 06 (6312) 8425



台紙



袋: PE PP

品名 容量	日本薬局方 ジュウヤク	HOUTTUYNIAE HERBA 12g×20包
使用上の 注意	相談すること 次の場合は、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。 ・しばらく服用しても症状の改善がみられない場合	
効能 効果	便秘、尿量減少、便秘に伴う吹出物	
用法 用量	大人（15歳以上）は1日1包を、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服して下さい。 ・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。	

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管して下さい。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
 - (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
 （誤用の原因になったり品質が変わるため）
 - (4) 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管して下さい。
 - (5) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。
- ◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

TOCHIMOTO
 株式会社 杉本天海堂
 大阪市北区末広町3番21号
 TEL 06 (6312) 8425

医薬品



ティーバッグ入り

TOCHIMOTO



HOUTTUYNIAE HERBA

ジュウヤク

日本薬局方

日本薬局方 ジュウヤク せんじ方と飲み方

医薬品



水を量って



とろ火で煎じる

相談すること

次の場合は、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。
・しばらく服用しても症状の改善がみられない場合

〔効能・効果〕

便秘、尿量減少、便秘に伴う吹出物

〔用法・用量〕

大人（15歳以上）は1日1包を、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服して下さい。

・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わるため）
- (4) 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管して下さい。
- (5) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。

・容器（煎じ用）は、土びんが一番よいですが、なければほうろう又は、アルマイト製のものを御使用下さい。鉄製の容器は御使用にならないでください。

◎製造にあたって、品質には細心の注意をはらっておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替えいたします。

TOCHIMOTO
株式会社 橋本天蔭堂

大阪市北区末広町3番21号
TEL 06 (6312) 8425

LOT No.



4 987466 123107