

より良い漢方を

生薬製剤

日の丸散

内容量
150g

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関 係 部 位	症 状
ひ 皮 ふ 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

胃痛、腹痛、さしこみ(疝痛、癰)、胃酸過多、胸やけ

■ 用法・用量

1日3回 食後に、湯または水にて服用してください。

大人(15才以上)	1回量 2g
8才以上15才未満	1回量 大人の1/2量
5才以上 8才未満	1回量 大人の1/3量
3才以上 5才未満	1回量 大人の1/4量
3才未満の乳幼児	服用しないこと

添付のさじ
すりきり1杯 約2gです

添付の計量さじにて服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分・分量 (1日量、6g) 中

日本薬局方 オウゴン……………	0.800g	日本薬局方 エンゴサク……………	0.600g
日本薬局方 オウバク……………	0.800g	日本薬局方 カンゾウ……………	0.900g
日本薬局方 オウレン……………	0.180g	日本薬局方 コウボク……………	0.480g
日本薬局方 ソウジュツ……………	0.800g	日本薬局方 シャクヤク……………	1.200g
日本薬局方 リョウキョウ……………	0.240g		

<保管及び取扱い上の注意>

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤は天産物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますがこれを食べたりしないようご注意ください。

【発売元・お問合せ先】

日の丸漢方

京都市下京区室町通六条下ル
TEL 075-351-6810

【製造販売元】

株式会社栃本天海堂

大阪市北区末広町3番21号

製造番号

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931