

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

せき・たんに

第②類医薬品

新 コデロン錠F

鎮咳去痰薬



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が
起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮痛薬、抗ヒスタミン剤を
含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、ア
レルギー用薬等)

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでく
ださい。

(眠気があらわれることがあります。)

3. 授乳中の人には本剤を使用しないか、本剤を服用する
場合は授乳を避けること。

4. 過量服用・長期連用しないでください。

(倦怠感や虚脱感があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に
相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 授乳中の人。

(4) 高齢者。

(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(7) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、
てんかん

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可
能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を
持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してくだ
さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その
場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚 や粘膜が青白くみえる。 疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなり くらくとする。血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等が あらわれる。

3. 服用後次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

せき、たん

用法・用量

1日3回、食間及び就寝時、水または白湯にて服用してください。

大人	1回	4錠
8才以上～15才未満	1回	2錠
5才以上～8才未満	1回	1錠

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導のもとに服用させてください。

成分・分量(12錠中)

ジヒドロコデインリン酸塩 ……30 mg－祛痰溶解作用
d α -メチルエフェドリン塩酸塩 …55 mg－気管拡張作用
クロルフェニラミンマレイン酸塩…12 mg－抗ヒスタミン
ジプロフィリン ……80 mg－強心作用
グアヤコールスルホン酸カリウム …270 mg－祛痰作用

添加物：メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、リン酸水素カルシウム水和物、グリセロリン酸カルシウム、乳糖水和物、パレイショデンプン、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

お問い合わせ先

本剤について何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

お客様相談室

TEL：(076) 435-0139 (代)
受付時間：午前 9:00 から午後 4:00
(土、日、祝日を除きます。)

製造販売元 **富山薬品株式会社**
富山市四方西岩瀬石瀬175