

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保存してください。

胃酸過多、胸やけ、消化不良、食べ過ぎ、二日酔いのむかつきに

第2類医薬品

胃腸薬

保寿胃腸薬

保寿胃腸薬は過剰な胃酸を中和し、胸やけ等の不快な症状を改善する制酸剤に、食物の消化を助け胃腸の負担を軽くする消化剤を配合し、弱った胃腸を元気にする多くの健胃生薬を配合した胃腸薬です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の診断を受けた人。
腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【有効成分】 1 日量 (3g) 中

炭酸水素ナトリウム	1380mg	ウイキョウ末	60mg
重質炭酸マグネシウム	450mg	ダイオウ末	75mg
沈降炭酸カルシウム	600mg	ケイヒ末	90mg
カンゾウ末	135mg	ゲンチアナ末	45mg
ビオチン	75mg	ショウキョウ末	60mg
(芳香剤) ℓ-メントール	15mg	(矯味剤) ニクズク末	15mg

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲みすぎ(過飲)、胃痛、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べすぎ(過食)、消化促進、食欲不振(食欲減退)、消化不良による胃部・腹部膨満感

【用法・用量】

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
15才以上（大人）	1 g	3 回
11才以上15才未満	2/3g	
8 才以上11才未満	1/2g	
5 才以上 8 才未満	1/3g	
5 才 未 満	服用させないでください。	

いずれも 1 日 3 回食後水又は白湯にて服用してください。

(添付のさじにすり切り 1 杯は約 1 g です)

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせ先 富山薬品株式会社
お客様相談窓口 ☎(076)435-0139
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元：富山薬品株式会社
富山市四方西岩瀬石瀬175