

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

湿疹・皮膚炎・かぶれに

ロコイダン[®]クリーム

LOCOIDAN[®] cream

特 徴

- ロコイダンクリームは、すぐれた抗炎症作用をもつ酪酸ヒドロコルチゾン[®]を主成分とする外用副腎皮質ホルモン剤で、皮膚の炎症を抑え、腫れ、かゆみなどをとりさります。
- ロコイダンクリームは、湿疹、皮膚炎、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん、あせもに効果があります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください
水痘、水虫・たむしなど又は化膿している患部

👤 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3)今までに薬や化粧品などによるアレルギー症状
(たとえば発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人
 - (4)患部が広範囲の人
 - (5)湿潤やただれのひどい人
 - (6)深い傷やひどいやけどの人
- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、水虫・たむしなどの白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2)5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合、又は、本剤の使用により症状が悪化した場合

〔チューブ穴の開け方〕

キャップを逆さにして、キャップの突起部をチューブ先端部に強く押しつけて開口してください。



(裏面につづきます)

効 能

湿疹、皮膚炎、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん、あせも

用法・用量

1日数回、患部に適量を塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成 分 本品100g中

酪酸ヒドロコルチゾン…………… 50mg

添加物として、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、セタノール、流動パラフィン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ワセリンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)本剤の使用期限は、外箱およびチューブに記載してありますので、使用期限のすぎた商品は使用しないでください。
- (5)この文書は、本剤をご使用の際に必要な注意事項などが記載されていますので、チューブと一緒に箱に入れて保管してください。



本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

カネボウ薬品株式会社 くすり相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元 **カネボウ薬品株式会社**

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造元 **鳥居薬品株式会社**

東京都中央区日本橋本町3-4-1 (〒103-8439)

提携 **山之内ヨーロッパB.V.**