

## ケロリン錠S

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	解熱鎮痛薬
承認販売名	
製品名	ケロリン錠S
製品名（読み）	ケロリンジョウ S
製品の特徴	ケロリン錠Sに配合されているアセチルサリチル酸は、痛みと熱のもととなるプロスタグランジンを抑え、痛みと熱にすばやく効果をあらわし、その作用も長時間持続します。又無水カフェインは脳血管の緊張をやわらげ、脳の血行を良くし、頭痛を鎮める働きがあります ケロリン錠Sは服用しやすい小粒の錠剤です。
使用上の注意	<p>■してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 次の人は服用しないでください。<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li><li>(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</li><li>(3) 15歳未満の小児。</li><li>(4) 出産予定日12週以内の妊婦。</li></ol></li><li>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬</li><li>3. 服用前後は飲酒しないでください。</li><li>4. 長期連用しないでください。</li></ol> <p>■相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。</li><li>(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。</li><li>(3) 授乳中の人は。</li><li>(4) 高齢者。</li><li>(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li><li>(6) 次の診断を受けた人。 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍</li></ol></li><li>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</li></ol>

〔関係部位：症状〕

皮膚：発疹・発赤，かゆみ，青あざができる

消化器：吐き気・嘔吐，食欲不振，胸やけ，胃もたれ，腹痛，下痢，血便，胃腸出血

精神神経系：めまい

その他：鼻血，歯ぐきの出血，出血が止まりにくい，出血，発熱，のどの痛み，背中の痛み，過度の体温低下

まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

〔症状の名称：症状〕

ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに，皮膚のかゆみ，じんましん，声のかすれ，くしゃみ，のどのかゆみ，息苦しさ，動悸，意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）：高熱，目の充血，目やに，唇のただれ，のどの痛み，皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり，急激に悪化する。

中毒性表皮壊死融解症：高熱，目の充血，目やに，唇のただれ，のどの痛み，皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり，急激に悪化する。

アレルギー反応に伴う急性冠症候群：しめ付けられるような胸の痛み，息苦しさ，胸を強く押さえつけられた感じ，あごの痛み，左腕の痛み，さむけ，ふらつき，発汗，発熱，意識の低下，口唇周囲のはれ，かゆみ，じんましん，発疹，のどのかゆみ，動悸等があらわれる。

肝機能障害：発熱，かゆみ，発疹，黄疸（皮膚や白目が黄色くなる），褐色尿，全身のだるさ，食欲不振等があらわれる。

ぜんそく：息をするときゼーゼー，ヒューヒューと鳴る，息苦しい等があらわれる。

再生不良性貧血：青あざ，鼻血，歯ぐきの出血，発熱，皮膚や粘膜が青白くみえる，疲労感，動悸，息切れ，気分が悪くなりくらつとする，血尿等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し，この文書を持って医師，歯科医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果	頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱
効能関連注意	次の1回量を1日2回を限度とし，なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。
用法・用量	〔年齢：1回量：1日服用回数〕 成人（15歳以上）：2錠：2回 15歳未満：服用しないこと

用法関連注意	<p>(1) 本剤は、定められた用法及び用量を厳守してください。</p> <p>(2) 錠剤の取出し方：錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のグラシン紙を破り、取り出してお飲みください（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）。</p>						
成分分量	<p>4錠中</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th><th>分量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセチルサリチル酸</td><td>1200mg</td></tr> <tr> <td>無水カフェイン</td><td>100mg</td></tr> </tbody> </table>	成分	分量	アセチルサリチル酸	1200mg	無水カフェイン	100mg
成分	分量						
アセチルサリチル酸	1200mg						
無水カフェイン	100mg						
添加物	無水リン酸水素カルシウム、タルク、トウモロコシデンプン、その他3成分						
保管及び取扱い上の注意	<p>(1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。</p> <p>(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。</p> <p>(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になります）。</p> <p>(4) 表示の期限をすぎた製品は服用しないでください。</p>						
消費者相談窓口	<p>会社名：富山めぐみ製薬株式会社            住所：富山県富山市三番町3-10            問い合せ先：お客様相談窓口            電話：076（421）5531            受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）</p>						
製造販売会社	<p>富山めぐみ製薬（株）            会社名：富山めぐみ製薬株式会社            住所：富山県富山市三番町3-10</p>						
販売会社							
剤形	錠剤						
リスク区分等	第「2」類医薬品						