



Hospeed Gel

指定医薬部外品

手指消毒剤
速乾性アルコールジェル

ホスピード[®]ジェル

500mL

(ポンプ付)

火気厳禁

第四類アルコール類
水溶性・危険等級Ⅱ

2010年2月改訂（第5版）

【△使用上の注意】

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります。)

次の人は使用しないこと

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

🗨️相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

製造番号

使用期限

製造販売元

 中北薬品株式会社

愛知県津島市白浜町字番場52-1

【効能・効果】

手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】

そのまま手指に塗布又は塗擦する。

＜用法・用量に関する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 使用に際しては直接の容器又は被包をよく読むこと。

【成分・分量】

エタノール76.9～81.4vol%を含有する。
添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシビニルポリマー、DIPAを含む。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 開封後、使用状況により、ノズル先に塊を形成することがあります。塊を形成した場合は、取り除いてご使用下さい。

【お問い合わせ先】

中北薬品株式会社 製薬工場事業部
電話0567-32-1431
受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



ポンプ:PP,PE
ボトル:PE



4