

日本薬局方 センナ 生 第②類医薬品

ナカジマ センナ

4 936246 108773 200g

使用期限 2020.03 Lot.

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。

二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。

三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元 中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 センナ 生 第②類医薬品

ナカジマ センナ

4 936246 108209 250g

使用期限 2020.03 Lot.

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。

二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。

三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元 中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 センナ 生 第②類医薬品

ナカジマ センナ

4 936246 100050 500g

使用期限 2020.03 Lot.

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。

二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。

三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元 中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 センナ 生 第②類医薬品

ナカジマ センナ

4 936246 110790 100g

使用期限 2020.03 Lot.

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。

二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。

三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元 中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 センナ 刻 第②類医薬品

ナカジマ センナ

4 936246 108650 200g

使用期限 2020.03 Lot.

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。

二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。

三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元 中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 センナ 刻 第②類医薬品

ナカジマ センナ

4 936246 100463 500g

使用期限 2020.03 Lot.

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。

二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。

三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元 中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 センナ ナカジマ センナ 第②類医薬品

使用上の注意

【してはいけないこと】

1. 本剤を服用中は他の下剤を服用しないこと。

2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること。

3. 大量に服用しないこと。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談して下さい

①医師の治療を受けている人。

②妊婦または妊娠していると思われる人。

③薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

④激しい腹痛、悪心、嘔吐の症状がある人。

⑤体力の衰えている人。

⑥胃腸が弱くて下痢しやすい人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

①服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹、発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心、嘔吐

②一週間位服用しても症状がよくなりません。

③まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 下痢の症状が続いたりひどくなったりした場合は、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

服用の際は、用法・用量を守って下さい。

効能又は効果

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：
頭重、のぼせ、肌あれ、吹き出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔。

用法及び用量

大人(15歳以上)は、1日3～6gに熱湯約150mlを加えて15分間煮てかすを取り去り、なるべく寝る前1回服用する。

保管及び取扱い上の注意

1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。

2. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

3. 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。

4. 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入していますので、これを一緒に服用しないようご注意ください。

5. ご購入の際、万一異常がありましたら、お手数ですが、お知らせください。

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2
製造販売元 中嶋生薬株式会社
TEL. 075-231-2633

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931