

第②類医薬品

精製

日本薬局方センナ
ナカジマ

センナ

500g

京都
中嶋生薬

センナ

第②類医薬品

使用上の注意

してはいけないこと

1. 本剤を服用中は他の下剤を服用しないこと。
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること。
3. 大量に服用しないこと。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - ① 医師の治療を受けている人。
 - ② 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - ③ 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - ④ 激しい腹痛、悪心、嘔吐の症状がある人。
 - ⑤ 体力の衰えている人。
 - ⑥ 胃腸が弱くて下痢しやすい人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

① 服用後次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心、嘔吐

② 一週間位服用しても症状がよくなる場合。

- ③ まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 下痢の症状が続いたりひどくなったりした場合は、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

服用の際は用法、用量を守ってください。

効能、又は効果

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：

頭重、のぼせ、肌あれ、吹き出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔。

用法及び用量

大人（15 歳以上）は、1 日 3～6 g に熱湯約 150 ml を加えて 15 分間煮てかすを取り去り、なるべく寝る前 1 回服用する。

保管及び取扱い上の注意

- ① 小児の手の届かない所に保管してください。
- ② 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ③ 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
- ④ 本品には防虫、防カビのために脱酸素剤を封入していますので、これと一緒に服用しないようにご注意ください。
- ⑤ ご購入の際、万一異常がありましたら、お手数ですがお知らせください。

副作用被害救済制度
電話：0120-149-931

製造元

京都市中京区二条通東洞院
西入仁王門町 29-2
中嶋生薬株式会社
TEL075-231-2633



使用
期限