

日本薬局方 カンゾウ
刻

第2類医薬品

ナカジマ カンゾウ



4 936246 100258

500g

使用期限 2020.03

Lot.

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

- 一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元

中嶋生薬株式会社

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 カンゾウ
小口切

第2類医薬品

ナカジマ カンゾウ



4 936246 101750

500g

使用期限 2020.03

Lot.

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

- 一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元

中嶋生薬株式会社

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 カンゾウ
生

第2類医薬品

ナカジマ カンゾウ



4 936246 101743

500g

使用期限 2020.03

Lot.

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

- 一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元

中嶋生薬株式会社

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 カンゾウ

ナカジマ カンゾウ

第2類医薬品

使用上の注意

してはいけないこと

1. 本剤を服用している間は、他の鎮静薬を服用しないこと。
2. 長期連用しないこと。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) むくみの症状のある人。
 - (7) 心臓病、高血圧、腎臓病の診断を受けた人。
2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹 発赤 かゆみ
消化器	悪心 嘔吐 食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合。

服用の際は、用法・用量を守って下さい

効能又は効果

激しい咳、咽頭痛の緩解。

用法及び用量

大人(15歳以上)は1日量5gを水約600mlで約400mlになるまで煮つめ、滓をこして取り去り、食前又は食間3回に分服して下さい。

保管及び取扱い上の注意

1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
2. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
3. 誤用をさけ品質を保持する為に他の容器に入れ変えないで下さい。
4. 本品は防虫、防カビのために脱酸素剤を封入していますのでこれと一緒に煎じないようにご注意下さい。
5. ご購入の際、万一異常がありましたらお手数ですがお知らせ下さい。

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2

製造販売元 中嶋生薬株式会社

TEL. 075-231-2633

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931