

Pure Drugs

第2類医薬品

日本薬局方カンゾウ末

ナカジマ

カンゾウ末

500g

Lot.



4 936246 101767

使用期限 2020.03

副作用救済制度 TEL 0120-149-931

製造販売元

中嶋生薬株式会社

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2

電話075(231)2633(代)

NAKAJIMASYOYAKU CO., LTD.

日本薬局方 カンゾウ末

ナカジマ カンゾウ末

使用上の注意

第2類医薬品

してはいけないこと

1. 本剤を服用している間は、他の鎮静薬を服用しないこと。
2. 長期連用しないこと。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)高齢者。
 - (4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6)むくみの症状のある人。
 - (7)心臓病、高血圧、腎臓病の診断を受けた人。
2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹 発赤 かゆみ
消化器	悪心 嘔吐 食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2)5～6日間服用しても症状がよくなる場合。

服用の際は用法、用量を守って下さい

効能又は効果

激しい咳、咽頭痛の緩解。

用法及び用量

大人(15歳以上)は1回量0.5gを1日2回、食前又は食間に服用して下さい。
(添付のサジ一杯は約0.5gです)

保管及び取扱い上の注意

- ①小児の手の届かない所に保管して下さい。
- ②直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- ③誤用をさけ品質を保持する為に他の容器に入れ変えないで下さい。
- ④本品は防虫、防カビのために脱酸素剤を封入していますのでご注意ください。
- ⑤ご購入の際、万一異常がありましたらお手数ですがお知らせ下さい。

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2

製造元 中嶋生薬株式会社 TEL. 075-231-2633