

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

冷え症、月経不順、更年期障害

とう き しゃく や く さん

てんぐ 当帰芍薬散(顆粒) 漢方製剤

てんぐ当帰芍薬散(顆粒)は、漢方処方当帰芍薬散の配合比率にしたがって6種の生薬末に結合剤(デンプン・ハチミツ)を加えて顆粒剤とし、アルミ箔包装による保存の安全と服用、携帯に便利なおようにつくられた漢方製剤です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 胃腸の弱い人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

<成分・分量>

1日量3包 (4.8g) 中

成 分	3包中	基 原
トウキ末	0.614g	Angelicae Radix セリ科。トウキの根。
センキュウ末	0.614g	Cnidii Rhizoma セリ科。センキュウの根茎。
シャクヤク末	0.818g	Paeoniae Radix ボタン科。シャクヤク又はその近縁植物の根。
タクシャ末	0.818g	Alismatis Rhizoma オモダカ科。サジオモダカの塊茎で通例周皮を除いたものである。
ブクリョウ末	0.818g	Poria サルノコシカケ科。マツホドの菌核。
ビャクジュツ末	0.818g	Atractylodis Rhizoma キク科。オケラ又はオオバナオケラの根茎。

<効能・効果>

冷え症又は冷えを伴う月経不順、月経痛、更年期障害、産前産後のめまい、頭重、肩こり、腰痛又はむくみ

- 冷え症・・・比較的栄養状態が乏しく、色白あるいは青白い方で、血色がさえない、足腰が冷えてなかなか温まらないという方。特に冷えを訴えなくても、夏に強く冬に弱いという傾向があり、冷房や扇風機の風にあたるのを好まない方。又、俗にいうお尻のつめたい方。
- 月経不順、月経痛・・・上記のような体質の方で月経不順の方。生理時の下腹部から腰にかけての痛みを感じる方。時におへその左斜め下、あるいは右斜め下のかかる痛みを感じる方。
- 更年期障害・・・閉経前後の更年期のホルモンのバランスの崩れによって生じる各種の症状で、頭痛、肩こり、めまい、腰痛や神経症状などに。
- 頭重、肩こり、腰痛又はむくみ・・・どちらかという体力のあまりない方、冷え症の体質の方でこのような症状のある方。

<用法・用量>

次の1回量を1日3回、白湯又は常水にて通常食間に服用して下さい。

食間とは・・・食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量
成 人(15歳以上)	1 包
7～14歳	2／3包
7歳未満	服用しないこと

用法・用量についての注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し2日以内に服用して下さい。

※ 本剤は天然物（生薬）を用いていますので、原料の相違により顆粒の色が多少異なる場合がありますが、効果に変わりありません。

お問い合わせ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元

二反田薬品工業株式会社

〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号