

NIKKO

第3類医薬品

エタプロコールG

殺菌消毒剤

500mL

飲用不可

貯 法：火気を避けて室温保存
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)
注 意：取扱い上の注意の項参照



製造販売元
日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉長町1593

使用に際して、この説明を必ず読むこと。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)
次の部位には使用しないこと。
粘膜(口唇等)、目の周囲、傷口

相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師または薬剤師に相談すること。
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感等

3. 長期使用する場合には、医師または薬剤師に相談すること。

【効能・効果】

手指・皮膚の殺菌・消毒

【用法・用量】

塗擦またはガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
- (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
- (4) 広範囲または長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- (5) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (6) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には直ちに眼科医の診療を受けること。
- (7) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

【組成・性状】

有効成分	エタノール(C ₂ H ₆ O)	76.9~81.4vol%
添 加 物	イソプロパノール(溶剤) グリセリン(湿潤剤)	4.9vol% 0.9W/V%
性 状	無色澄明の液で、特異なおいがある。	

〈成分に関連する注意〉

アレルギーテストの検査を受ける場合には、本剤を使用していることを医師に知らせること。(アレルギーテストの検査値に影響をおよぼすことがある。)

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 開封時、容器の肩部または底部を持ち、液がとびださないように、キャップを開けること。

副作用被害救済制度のお問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

火気厳禁

第4類

アルコール類

水溶性

危険等級Ⅱ



容 器：PE
キャップ：PP

製造番号

使用期限