

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

解熱鎮痛薬

腰痛、神経痛、肩こり痛に セメジン顆粒

〈シャクヤク・カンゾウエキス配合〉

匂う、かぶれる、目立つ心配のない、セメジン顆粒は内服療法の薬です

腰痛、神経痛、肩こり痛の痛みは、自分一人が苦しい思いをし、他人にはわかってもらえない苦しい症状です。その原因は筋肉の疲労、冷え、血圧異常、背骨の異常などさまざまです。その原因を追求し、根治することが望ましいのですが同時に耐えられない“痛み”の症状をとり除くことが大切です。

セメジン顆粒は腰痛、神経痛、肩こり痛等にすぐれた効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

3. 服用時は飲酒しないでください

4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。

むくみ

(7) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

裏面も必ずお読みください

【効能・効果】

- 肩こり痛・腰痛・神経痛・筋肉痛・関節痛・打撲痛・頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

【用法・用量】

次の1回量を、なるべく空腹時をさけて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用限度	服用間隔
成人（15歳以上）	1 包	2 回	6 時間以上
11歳以上15歳未満	2/3包		
7 歳以上11歳未満	1/2包		
3 歳以上 7 歳未満	1/3包		
3 歳未満の乳幼児	服用しないでください。		

＜用法・用量に関連する注意＞

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分と作用】

1 日量〔2 包（1 包：2 g）〕中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	作 用
地竜乾燥エキス （原生薬換算量）	260mg （2000mg）	体温調節中枢を鎮静し、体表面の血行をよくし、解熱効果をあらわします。
シャクヤクエキス （原生薬換算量）	200mg （2000mg）	抗炎症作用や鎮けい作用により、筋肉のはげしい痛みにも効果があります。
カンゾウ乾燥エキス （原生薬換算量）	400mg （2000mg）	
アセトアミノフェン	600mg	末梢血管を拡張して血行をよくし、中枢性の解熱・鎮痛効果をあらわします。

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、軽質無水ケイ酸、ケイヒ油、ウイキョウ油を含有します。

＜成分に関連する注意＞

本剤は生薬エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
4. 使用期限（外箱及び袋に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。
5. 1 包を分割して、服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用してください。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

発 売 元：天野商事株式会社 お客様相談室
 名古屋市中区丸の内三丁目13番12号
 電 話：(052)951-2340
 受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
 製造販売元：日新薬品工業株式会社 お客様相談室
 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野 80-1
 電 話：(0748)88-5825
 受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発売元



天野商事株式会社

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

製造販売元 日新薬品工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町田堵野 80-1