

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品
解熱鎮痛薬

腰痛、神経痛、肩こり痛に
セメジン顆粒

〈シャクヤク・カンゾウエキス配合〉

腰痛、神経痛、肩こり痛の痛みは、自分一人が苦しい思いをし、他人にはわかってもらえない苦しい症状です。その原因は筋肉の疲労、冷え、血圧異常、背骨の異常などさまざまです。その原因を追求し、根治することが望ましいのですが同時に耐えられない“痛み”の症状をとり除くことが大切です。
セメジン顆粒は腰痛、神経痛、肩こり痛等にすぐれた効果を発揮します。
いわゆる貼り薬のような匂う、かぶれる、目立つといった心配のない内服療法薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

- 1. 次の人は服用しないでください
 - （1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - （2）本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
- 3. 服用前後は飲酒しないでください
- 4. 長期連用しないでください

🗨 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - （1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - （3）高齢者。
 - （4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - （5）次の症状のある人。
むくみ
 - （6）次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群（ステイブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。

裏面も必ずお読みください

症 状 の 名 称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- 【効能・効果】
- 肩こり痛・腰痛・神経痛・筋肉痛・関節痛・打撲痛・頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
 - 悪寒・発熱時の解熱

【用法・用量】

次の1回量を、なるべく空腹時をさせて服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用限度	服用間隔
成人（15歳以上）	1 包	2 回	6 時間以上
11歳以上15歳未満	2/3包		
7 歳以上11歳未満	1/2包		
3 歳以上 7 歳未満	1/3包		
3 歳未満の乳幼児	服用しないでください。		

- <用法・用量に関連する注意>
1. 用法・用量を厳守してください。
 2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分と作用】

1 日量〔2 包（1 包：2 g）〕中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	作 用
地竜乾燥エキス （原生薬換算量）	260mg (2000mg)	体温調節中枢を鎮静し、体表面の血行をよくし、解熱効果をあらわします。
シャクヤクエキス （原生薬換算量）	200mg (2000mg)	抗炎症作用や鎮けい作用により、筋肉のはげしい痛みにも効果があります。
カンゾウ乾燥エキス （原生薬換算量）	400mg (2000mg)	
アセトアミノフェン	600mg	末梢血管を拡張して血行をよくし、中枢性の解熱・鎮痛効果をあらわします。

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、軽質無水ケイ酸、ケイヒ油、ウイキョウ油を含有します。

<成分に関連する注意>

本剤は生薬エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果にはかわりありません。

- 【保管及び取扱い上の注意】
1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 2. 小児の手の届かない所に保管してください。
 3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
 4. 使用期限（外箱及び袋に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。
 5. 1 包を分割して、服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用してください。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

発 売 元：天野商事株式会社

お 客 様 相 談 室

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

電 話：(052)951-2340

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製 造 販 売 元：日新薬品工業株式会社

お 客 様 相 談 室

滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

電 話：(0748)88-4156

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発売元

AMANO

天野 商 事 株 式 有 限 公 司

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

製造販売元

日新薬品工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町田堵野 80-1