



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品
鎮咳去痰薬

トピックせき止め液

トピックせき止め液は、せきをしずめる南天実、たんをだしやすくする麦門冬・桔梗、その他鎮咳・去痰成分を配合したせき・たんの効果のある液剤です。

⚠️〔使用上の注意〕

❌ してはいけないこと

- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）
1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
（眠気等があらわれることがあります。）
 3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
 4. 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（3）高齢者。
（4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
（5）次の症状のある人。
 高熱、排尿困難
（6）次の診断を受けた人。
 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無 顆 粒 球 症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕
せき、たん

裏面も必ずお読みください

【用法・用量】

次の1回量を食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。また、場合により1日6回まで服用できますが、このような場合は約4時間の間隔をおいてください。なお、服用の際は、添付の計量カップではかって服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	10 mL	3回 また、止むを得ない場合には約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用できます。
11歳以上15歳未満	6.5mL	
8歳以上11歳未満	5mL	
5歳以上8歳未満	3.3mL	
3歳以上5歳未満	2.5mL	
1歳以上3歳未満	2mL	
1歳未満の乳児	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
4. 本剤は1歳未満の乳児には服用させないでください。

【成分と作用】

60mL中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量	作 用
ジヒドロコデインリン酸塩	30 mg	せきの中枢に作用して、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75 mg	気管支を拡張して、せきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	270 mg	気道分泌を促進して、たんの粘稠度を減少させ、たんをだしやすくします。
麦門冬流エキス （原生薬換算量）	1100 mg (1100 mg)	
桔梗流エキス （原生薬換算量）	600 mg (600 mg)	
南天実流エキス （原生薬換算量）	2000 mg (2000 mg)	せきをしずめる効果があります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12 mg	アレルギー性のせきに効果があります。

添加物として、精製白糖、D-ソルビトール液、プロピレングリコール、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸ブチル、pH調節剤、エタノール、ベンジルアルコール、エチルバニリン、バニリン、香料を含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
4. キャップをしめる際、ビンの口をよく拭いてから、しっかりしめてください。
5. 計量カップは、使用のつどよく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。
6. 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。また、使用期限内であっても、開栓後はなるべく早く服用してください。

お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室

〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

☎0120-415-688

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

日新薬品工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1