

ノドニイセきどめシロップ

〈特長〉

ノドニイセきどめシロップは、せきをしずめる南天実、たんをだしやすくする麦門冬・桔梗、その他鎮咳・去痰成分を配合したせき・たんに関与のある液剤です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

4. 過量服用・長期連用しないでください

(倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

せき、たん

[用法・用量]

次の量を食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。また、場合により、1日6回まで服用できますが、このような場合には約4時間の間隔をおいてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	10mL	通常1日3回毎食後に服用します。 場合により1日6回まで服用しても差し支えありませんが、その場合は約4時間の間隔をおいて服用してください。
11歳以上15歳未満	6.5mL	
8歳以上11歳未満	5mL	
5歳以上8歳未満	3.3mL	
3歳以上5歳未満	2.5mL	
1歳以上3歳未満	2mL	
1歳未満の乳児	服用しないでください。	

・添付の計量カップをご使用ください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (4)本剤は1歳未満の乳児には服用させないでください。

[成分・分量]

60mL中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量	はたらき
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中枢に作用して、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を拡張して、せきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg	気道分泌を促進して、たんの粘稠度を減少させ、 たんをだしやすくします。
麦門冬流エキス (原生葉換算量)	1100mg (1100mg)	
桔梗流エキス (原生葉換算量)	600mg (600mg)	
南天実流エキス (原生葉換算量)	2000mg (2000mg)	せきをしずめる効果があります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	アレルギー性のせきに効果があります。

添加物として、精製白糖、D-ソルビール液、プロピレングリコール、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸ブチル、pH調節剤、エタノール、ベンジルアルコール、エチルパニリン、パニリン、香料を含有します。

[内容量]

100ml

[保管および取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)キャップをしめる際、ピンの口をよく拭いてから、しっかりしめてください。
- (5)計量カップは、ご使用のつどよく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。
- (6)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。また、使用期限内であっても、開栓後はなるべく早く服用してください。

お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室
〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1
☎ 0120-415-688
受付時間／9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

メモ

購入店など記入して下さい。