

服用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

カルシウム液剤

医薬部外品

ナルテCa[®]

製品の特徴

カルシウムは「生命の炎」ともいわれ、健康な日常生活を維持するために大切な働きをしています。しかしながら、日本人の食生活でカルシウムは不足しがちです。

カルシウムが不足するとイライラしたり、循環器や消化器の機能をにぶらせたり、骨からカルシウムが溶けだして骨は徐々にスカスカになり、老年期に至っては骨粗鬆症という病気にもなりかねません。このためにも、常日頃から十分なカルシウムの補給が必要です。

従ってカルシウムは育ちざかりのお子様や妊産婦、授乳婦に必要なことはいうまでもなく、成人にも不足してはならないものです。

ナルテCaは吸収のよい液体タイプのカルシウムです。グレープフルーツ風味のくせのないさっぱりした味なので、お子様からお年寄りの方まで幅広くお飲み頂けます。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること。
医師の治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書をもって医師または薬剤師に相談すること。
服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、胃痛、食欲不振
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること。
下痢、便秘。
- 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談すること。

成分分量

40mL（成人1日量）中

成 分	分 量	はたらき
グルコン酸カルシウム	3000mg (カルシウムイオンとして268.1mg)	骨をつくるのに大切なカルシウムを補います。

添加物として、クエン酸、D-ソルビトール、塩化Na、安息香酸、リン酸リボフラビンNa、プロピレングリコール、pH調整剤、香料を含有する。

用法用量

次の1回量を1日1～2回服用する。

(服用には添付の計量コップを使用ください。数字の単位はmLです。)

年 令	1 回量
成人 (15才以上)	20mL
11才以上 15才未満	15mL
7才以上 11才未満	10mL
3才以上 7才未満	5 mL
1才以上 3才未満	2. 5mL
1才未満	服用しないこと

〈用法用量に関連する注意〉

- (1)用法用量を守ること。(他のカルシウムを含有する製品を同時に使用する場合には、過剰摂取などに注意すること。)
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

効能効果

次の場合の骨歯の発育促進：虚弱体質、腺病質。

妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止。

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと (誤用の原因になったり品質が変わる)。
4. 服用のつどフタをよくしめること。
5. 雑菌などの汚染のおそれがあるので、ピンの口に直接口をつけて服用したり、計量コップに入れた薬液をピンにもどさないこと。
6. 品質保持の点から開栓後は3週間以内に服用すること。
7. 開栓後、味、臭いに変化があり異常を感じた場合は直ちに服用を中止すること。
8. ピンの口、計量コップは常に清潔に保つこと。
9. ピンの口、キャップに白い結晶が現れたり、白い沈殿が生じることがありますが、これは内容成分のカルシウムの結晶です。
10. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

◎本剤を服用されるほか、日常生活でも次の点にご注意下さい。

●日光浴をするなど、適度に日光に当たりましょう。



●タバコ、アルコール類、コーヒーなどの嗜好品をとり過ぎないようにしましょう。



●適度な運動をし、筋肉と骨を鍛えましょう。



●カルシウムやビタミンDを多く含む食品をとりましょう。



INDICATIONS : For promotion of growth of bones and teeth in weak constitutions and scrofulosis.

For prevention of fragility of bones and teeth in pregnant or lactating women.

DOSAGE : For adults (15 years and over) 20mL, for children 11 to 14 years 15mL, for children 7 to 10 years 10mL, for children 3 to 6 years 5mL, for children 1 to 2 years 2. 5mL, 1 to 2 times a day. Not for children under 1 year.

〔問い合わせ先〕

1. 購入した販売店
2. 日水製薬株式会社
お客様相談窓口 電話：03-3837-0987
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
(土・日・祝日を除く)

製造販売元



日水製薬株式会社

東京都台東区上野3-23-9