

〔注意〕服用に際し、この説明書を必ず読むこと。
また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

カルシウム液剤

骨歯のカルシウム補給に

医薬部外品

バイランCa[®]

製品の特徴

バイランCaは、カルシウム吸収の良いイオン化した液体タイプの医薬品です。小さいお子さま（1才）からお年寄りまで服用しやすいくせないサッパリしたグレープフルーツ味のカルシウム液剤です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること。
医師の治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書をもって医師または薬剤師に相談すること。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、胃痛、食欲不振
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること。
下痢、便秘。
- 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談すること。

成分分量 40mL（成人1日量）中

成 分	分 量	はたらき
グルコン酸カルシウム	3000mg (カルシウムイオンとして268.1mg)	骨格や歯の原料だけでなく、さまざまなカラダの機能調節に重要な役割を担っています。

添加物としてクエン酸、D-ソルビトール、塩化Na、安息香酸、リン酸リボフラビンNa、プロピレングリコール、pH調整剤、香料を含有する。

用法用量

次の1回量を1日1～2回服用する。
（服用には添付の計量コップを使用ください。数字の単位はmLです。）

年 令	1 回 量
成人（15才以上）	20mL
11才以上 15才未満	15mL
7才以上 11才未満	10mL
3才以上 7才未満	5 mL
1才以上 3才未満	2.5mL
1才未満	服用しないこと

（用法用量に関連する注意）

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 用法・用量を守ること。（他のカルシウムを含有する製品を同時に使用する場合には、過剰摂取などに注意すること）

効能効果

次の場合の骨歯の発育促進：虚弱体質、腺病質。
妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止。

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 開栓後は冷蔵庫に立てて保管すること。
5. 服用のつどフタをよくしめること。
6. 雑菌などの汚染のおそれがあるので、ビンの口に直接口をつけて服用したり、計量コップに入れた薬液をビンにもどさないこと。
7. 品質保持の点から開栓後3週間以内に服用すること。
8. 開栓後、味、臭いに変化があり異常を感じた場合は直ちに服用を中止すること。
9. ビンの口、計量コップは常に清潔に保つこと。
10. ビンの口、キャップに白い結晶が現れたり、白い沈殿が生じることがありますが、これは内容成分のカルシウムの結晶です。
11. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

【問い合わせ先】

1. 購入した販売店
2. 日水製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3837-0987
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
(土・日・祝日を除く)

虚弱体質・腺病質の方の 骨歯の発育促進に

●乳幼児期

日に日に大きくなる赤ちゃん、成長の著しいこの時期にカルシウム補給は大切で、4～6才ごろは永久歯の成長のためにも大切です。

●成長期

骨格がしっかりしてきて、成長スピードが早くなる時期です。成長期の骨の発育が中高年期の骨の老化を左右します。


●中高年期

加齢とともに、骨や歯が弱ってくる時期です。とくに閉経期以降の女性はホルモンバランスが変化し、骨から血液中へカルシウムが溶け出しやすくなっており、男性よりも骨がもろく、骨折しやすくなる傾向があります。男女とも中高年期には食事などによる十分なカルシウム補給を心がけることが大切です。

妊娠・授乳期の骨歯の脆弱防止

妊娠中は母体のためだけでなく胎児の発育のためにも、十分なカルシウムの補給が必要です。とくに妊娠後期には乳歯の発育のために重要です。また、授乳期は赤ちゃんの急速な成長、骨格をしっかりと発育させるために、母親のカルシウム摂取が必要となります。

こんな時、こんな方の
カルシウム補給に
役立ちます。



製造発売元
日水製薬株式会社
東京都台東区上野3-23-9