

第3類医薬品

新コンチーム錠

効能・効果

消化促進、消化不良、食欲不振（食欲減退）、食べ過ぎ（過食）、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感、整腸（便通を整える）、腹部膨満感、軟便、便秘

用法・用量

次の1回量を1日3回毎食後に服用してください
成人（15才以上）……………4錠
8才以上15才未満……………3錠
5才以上 8才未満……………2錠
5才未満……………服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

（1）定められた用法・用量を厳守してください
（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください

成分・分量

成人1日量（12錠）中
乾燥酵母（ビール酵母）……………2070mg
ラクトミン（乳酸菌末）……………36mg
ビフィズス菌……………30mg
納豆菌末……………100mg
ピオヂアスターゼ1000……………40mg
セルラーゼAP3……………12mg
沈降炭酸カルシウム……………425mg
チアミン硝酸塩（ビタミンB1硝酸塩）…9mg
リボフラビン（ビタミンB2）……………3.6mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、バニリン、セルロース、白糖、無水ケイ酸、ステアリン酸Mgを含有しています

<成分・分量に関連する注意>

本剤に配合されているリボフラビン（ビタミンB2）により尿が黄色になることがあります

新

コンチーム[®]錠

乾燥酵母配合

おなか環境を改善!



善玉菌の代表
【ビフィズス菌】

胃酸に強い
【納豆菌】

食物の消化を助ける
【消化酵素】

【整腸・消化剤】

第3類医薬品

120錠

使用上の注意

■相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください（1）医師の治療を受けている人（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人（3）次の診断を受けた人 甲状腺機能障害（4）抗凝血剤「ワルファリン」を服用している人 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください【関係部位：症状】皮膚：発疹・発赤、かゆみ 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 便秘 4.2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください（2）小児の手が届かない所に保管してください（3）他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わる）（4）使用期限をすぎた製品は服用しないでください

本品についてのお問い合わせ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室
電話：（03）3370-7174（代表）
受付時間：午前9:00から午後5:00まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構 ☎ 0120-149-931



詰め物：PE
キャップ：PP, PE
ガラス：瓶



発売元

日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
<https://www.nippo-yakuhin.jp/>
電話（03）3370-7174（代表）



製造販売元

日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南関35-3

開 封 口



New Conzym
Streptococcus faecalis
Bifidobacterium longum
Bacillus natto

消化酵素

食物の消化を助ける

ビフィズス菌

善玉菌の代表

納豆菌

胃酸に強い

乾燥酵母配合

整腸・消化剤

第3類医薬品

おなか環境を改善!

新

コンチーム錠[®]

120錠