

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

ねつ・せき・のどの痛みに 総合感冒薬 **マイフーロン®ゴールド錠**

「かぜ」の症状は、寒気、発熱、のどの痛み、頭痛、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、せき、たんなどさまざまです。「かぜ」はひきはじめに治すことが大切です。

マイフーロンゴールド錠は、解熱・鎮痛、鎮咳・去痰、抗ヒスタミン剤等を配合した総合感冒薬で、かぜの諸症状の緩和にすぐれた効果をあらわします。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気があらわれることがあります)

4. 服用時は飲酒しないでください。

5. 長期連用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザににかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。
- (5) 高齢者。
- (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振	そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステevens-ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。 (これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜ ん そ く	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
便秘、口のかわき

■効能・効果■

かぜの諸症状（発熱、せき、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、たん、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

■用法・用量■

次の用法・用量を守り、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	3 錠	3 回
11歳以上 15歳未満	2 錠	
5 歳以上 11歳未満	1 錠	
5 歳未満の幼児	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2) 錠剤の取り出し方

〈PTPシートの取り出し図〉

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してください（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）。



■成分・分量とはたらき■

マイフロンゴールド錠は、9錠中に下記の成分・分量を含有します。

成 分	分 量	は た ら き
アセトアミノフェン	495mg	熱を下げ、頭痛、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛みをやわらげます。
エテンザミド	450mg	
マレイン酸クロルフェニラミン	7.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみなどのかぜによるアレルギー症状をおさえます。
リン酸ジヒドロコデイン	18mg	せきをしずめます。
dl-塩酸メチルエフェドリン	60mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	195mg	たんのきをよくします。
無水カフェイン	75mg	脳血管の緊張をやわらげ、頭痛をしずめます。
ビタミンB ₂	12mg	発熱時に消耗しやすいビタミンB ₂ を補給します。
キキョウ乾燥エキス-S (桔梗として)	60mg (600mg)	去痰薬として用いる植物性生薬です。
石蒜エキス-A (石蒜として)	15mg (120mg)	
地竜エキス散-N (地竜として)	225mg (450mg)	発熱、悪寒に用いる動物性生薬です。
ゴ オ ウ	3mg	解熱、のどの痛みの緩和、鎮痛に用いる動物性生薬です。

添加物として、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、タルク、炭酸Ca、バレイシヨデンブソ、アラビアゴム、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、酸化チタン、ステアリン酸Mg、ゼラチン、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本品に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります。

■保管及び取扱い上の注意■

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）。
(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
(5) 開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

■お問い合わせ先■

日本製薬工業株式会社 お客様相談室 電話(0568)42-1234
受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

製 造 販 売 元

日本製薬工業株式会社

愛知県小牧市小木東一丁目186

®：登録商標