

第②類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

ねつ・せき・のどの痛みに

総合感冒薬

マイフーロン ゴールド錠

「かぜ」の症状は、さむけ、発熱、のどの痛み、頭痛、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、せき、たんなどさまざまです。「かぜ」はひきはじめに治すことが大切です。

マイフーロンゴールド錠は、解熱・鎮痛、鎮咳・去痰、抗ヒスタミン剤などを配合した総合感冒薬で、かぜの諸症状の緩和にすぐれた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 12歳未満の小児。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

5. 服用前後は飲酒しないでください

6. 長期運用しないでください

 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌 尿 器	排尿困難
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状（発熱、せき、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

次の用法・用量を守り、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
12歳以上 15歳未満	2錠	
12歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してください（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）。



成分・分量

マイフーロンゴールド錠は、9錠中に下記の成分・分量を含有します。

成 分 ・ 分 量	は た ら き
アセトアミノフェン……………495mg	熱を下げ、頭痛、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛みをやわらげます。
エテンザミド……………450mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………7.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみなどのアレルギー症状をおさえます。
ジヒドロコデインリン酸塩……………18mg	せき中枢に働いてせきをしずめます。
d-メチルエフェドリン塩酸塩……………60mg	気管支をひろげてせきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム……………195mg	たんのきをよくします。
無水カフェイン……………75mg	脳血管の緊張をやわらげ、頭痛をしずめます。
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）……………12mg	発熱時に消耗しやすいビタミンB ₂ を補給します。
キキョウエキス……………60mg（桔梗として 600mg）	たんを出しやすくする植物性生薬です。
セキサンエキス……………15mg（石蒜として 120mg）	
ジリュウエキス散 225mg（地竜として 450mg）	発熱、悪寒に用いる動物性生薬です。
ゴ オ ウ……………3mg	解熱、のどの痛みの緩和、鎮痛に用いる動物性生薬です。

添加物として、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、タルク、炭酸Ca、バレイショデンプン、アラビアゴム、ヒプロメロース、酸化チタン、ステアリン酸Mg、ゼラチン、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のリボフラビンによるもので、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。

お問い合わせ先

日本製薬工業株式会社 お客様相談室 電話(0568)42-1234
受付時間 9:00~12:00
14:00~17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

日本製薬工業株式会社

愛知県小牧市小木東一丁目186