

ご使用に際して、この添付文書を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存してください。

第2類医薬品

ベラミスF

【特徴】

- 18種類の生薬を使用した、防風通聖散料乾燥エキスを配合。
- 「防風通聖散」は中国の医書「宣明論」に記載されている漢方処方です。
- 肥満症、高血圧の随伴症状(どうき、肩こり、のぼせ)、便秘、むくみを改善してくれる効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害



2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	腹痛、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる

- (2) 1ヶ月位(便秘に服用する場合は1週間位)服用しても症状がよくならない場合
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。 下痢

【効能・効果】

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	4錠	3回

- 定められた用法・用量を守ること。
- 食間とは……「食事と食事の間」を意味します。
食後約2時間のことをいいます。

【成分・分量】

大人1日の服用量12錠(1回4錠)中、次の成分を含んでいます。

防風通聖散料乾燥エキス……………1.52g

トウキ ……………	0.6g	シャクヤク ……………	0.6g
センキュウ ……………	0.6g	サンシシ ……………	0.6g
レンギョウ ……………	0.6g	ハッカ ……………	0.6g
ケイガイ ……………	0.6g	ボウフウ ……………	0.6g
マオウ ……………	0.6g	ビャクジュツ ……………	1.0g
キキョウ ……………	1.0g	オウゴン ……………	1.0g
カンゾウ ……………	1.0g	セッコウ ……………	1.0g
ダイオウ ……………	0.75g	硫酸ナトリウム十水和物…	0.75g
ショウキョウ ……………	0.2g	カッセキ ……………	1.5g


添加物として乳糖水和物、セルロース、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、マクロゴール、カルメロースCaを含有する。

【成分に関する注意】

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 容器の中の詰め物は、破損防止用ですので開封後は捨ててください。
- (5) 吸湿しやすいため、服用のつど容器のキャップをしっかり閉めてください。
- (6) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。



副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931, 03-3506-9411

製造販売元

寧薬化学工業株式会社

【お問い合わせ】

〒635-0035

奈良県大和高田市旭南町2-25

TEL: 0745-22-4151

受入時間: 9:00~16:00

(土・日・祝祭日を除く)