

貯 法	直射日光を避けて室温保存
使 用 期 限	容器に記載

承認番号	21800DZX10610000
承認年月	2006 年 3 月
販売開始	2006 年 6 月

外皮消毒剤：10%ポビドンヨード液含浸綿棒

アプリスワブ

*指定医薬部外品

【使用上の注意】

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は使用しないこと

- （1） 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （2） 患部が広範囲の人。
- （3） 深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- （1） 医師の治療を受けている人。
- （2） 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- （3） 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- （1） 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
シ ョ ッ ク （アナフィラキシー）	使用後すぐにじんましん、浮腫、 胸苦しさ等とともに、顔色が青白 くなり、手足が冷たくなり、冷や 汗、息苦しさ等があらわれる

- （2） 5～6 日間使用しても症状がよくなる場合

その他の注意

- （1） 大量かつ長時間の接触によって接触皮膚炎、皮膚変色があらわれることがあるので、溶液の状態で長時間皮膚と接触させないこと。
- （2） 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い落としてから使用すること。
- （3） 個包装が開封、破損や他の汚染が見られる場合は使用しないこと。
- （4） 一度個包装を開封したものは、直ちに使い切ること。

【効能・効果】

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

【用法・用量】

本剤を 1 日数回、そのまま患部に塗布して用いる。

（用法・用量に関連する注意）

- （1） 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- （2） 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

- （3） 外用にのみ使用すること。

【成分】

本剤は、下記の成分を含有する。

成 分	溶液 100mL 中の分量
日 局 ポビドンヨード	10g (有効ヨウ素として 1g)

薬液の担体として、綿棒を含む。

添加物としてポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、クエン酸、リン酸水素ナトリウム、pH 調整剤を含有する。

【保管及び取り扱い上の注意】

- （1） 希釈を行わず、そのまま使用すること。
- （2） 経口投与、目及び体腔内に使用しないこと。
- （3） 衣類に付いた場合は水で洗い落とす。また、チオ硫酸ナトリウム溶液で脱色できる。
- （4） 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- （5） 小児の手の届かない所に保管すること。
- （6） 他の容器に入れかえないこと。
（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- （7） 綿棒等を継ぎ足して使用しないこと。

【包装】

1 包 1 本入り、1 箱 50 包入り

【消費者相談窓口】

白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

お客様相談室 TEL:0120-01-8910

受付時間/9:00～17:00（月～金※祝日を除く）

休日・夜間 TEL03-3987-6111

【製造販売業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12