

2021 年 10 月 作成(初版)

日本標準商品分類番号 872615

貯 法	直射日光を避けて室温保存
使 用 期 限	パッケージに記載

承 認 番 号	30300DZX00067000
承認年月日	2021 年 1 月 28 日
販 売 開 始	

外皮消毒剤<高圧蒸気滅菌処理済>

指定医薬部外品

ワンショットプラスヘキシジン 0.1

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が広範囲の人。
- (3) 深い傷やひどいやけどの人。

次の部位には使用しないこと

粘膜、創傷面および目のまわり

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

【効能・効果】

手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】

用時脱脂綿を取り出し、1 日 3 回そのまま手指又は皮膚を清拭する。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) やけどのような痛みを伴う炎症をおこすことがあるので、溶液の状態で長時間皮膚と接触させないこと。
- (4) 外用にのみ使用すること。殺菌効果の即効性が低いので、充分効果を生じさせるため、本品塗布後、乾燥まで待つこと⁽¹⁾
- (5) 石けん類や血清、膿汁等が付着していると、十分な効果が得られないことがあるので、十分に洗い流してから使用すること。
- (6) 一度個包装を開封したものは、無菌状態が保てないので、開封後直ちに使い切ること。
- (7) 個包装が開封、破損や他の汚染が見られる場合は使用しないこと。

【成分・分量】

本品 1 包中、下記の成分を含有する。

成 分	含 有 量
0.1w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩溶液	1.8mL
医療脱脂綿(4cm×8cm 2 折 1 枚)	0.35g

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光を避け、湿気の少ないなるべく涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 綿の表面あるいは内部に黄色又は黒色の斑点状のものが見られることがあるが、天然の種子の一部であるので使用上の問題はない。
- (4) 誤用や品質低下を避けるため、再使用や他の容器に移し替えないこと。
- (5) 使用後は、トイレに流さないで、衛生的に処理すること。
- (6) 本品は、小売での開封小分け販売はできない。

【消費者相談窓口】

製造販売業者

白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

お客様相談室 TEL 0120-01-8910(フリーダイヤル)

受付時間 / 9:00～17:00(月～金※祝日を除く)

休日、夜間 TEL 03-3987-6111

URL: <https://www.hakujuji.co.jp/>

【製造販売業者等の名称又は氏名及び住所等】

製造販売業者：白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

【主要文献及び文献請求先】

- (1) アルコール禁患者におけるクロルヘキシジングルコン酸塩による静脈採血時の適正な消毒時間：採血シミュレーションを加えた最近学的検討 医学検査 61, p374-379, 2012 年 03 月 25 日
文献請求先：白十字株式会社 TEL 0120-01-8910