



LEVAVAN

ローションタイプ

レーバン®

〈殺菌消毒薬〉

第2類医薬品

〔使用上の注意〕

『相談すること』

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ


3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります)



キャップ
ボトル
ラベル



4

レーバン®

ローションタイプ

〔成分・分量〕100ml中

ペンザルコニウム塩化物 ……0.005g
 テシット・デシチン ……0.10g
 プロピレングリコール ……3.00g
 添加物としてハッカ油を含有します。

〔効能・効果〕

陰部そう痒症、男女陰部清浄、肛門
 周囲炎、脱肛、肛門裂創、痔核

〔用法・用量〕

脱脂綿又はガーゼに浸して、1日数回患部を清拭してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください
- (3) 外用にのみ使用してください

第2類医薬品 100ml

発売元



日邦薬品工業株式会社
 東京都渋谷区代々木3-46-16
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元



万協製薬株式会社
 三重県多気郡多気町五桂1169-142

お客様相談室
 電話 0598-30-5376

副作用被害救済制度
 ☎0120-149-931