

使用前にこの説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう保管して下さい。

切傷・すり傷・つき傷・靴ずれ治療剤

テープ軟膏

◆皮ふは私たちの体を覆っている厚さ1～4ミリの膜で、外部からのさまざまな刺激を受けとめ内部を保護しています。この膜は年齢はもちろんのこと、季節、気温、大気の状態、内臓、脂腺・汗腺の分泌などに影響を受けます。加えて現代は排気ガスや加工食品、化粧品、種々の化学製品のために私たちの皮ふはかなりダメージを受けており、トラブルも多種多様です。切傷・すり傷・靴ずれは日常生活の中でひんぱんに起こる皮ふ疾患といえます。これらの治療には、化膿菌感染を防ぎ炎症をやわらげる薬剤が適しています。

◆**テープ軟膏**は、痛みを鎮めるアミノ安息香酸エチル、出血を止めるdl-塩酸メチルエフェドリン、殺菌作用のあるアクリノール、炎症を抑える酸化亜鉛、止血剤の次没食子酸ビスマス等を配合した軟膏剤です。家庭常備薬としてお使い下さい。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用する前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 湿潤やただれのひどい人。
 - (5) 患部が広範囲の人。
 - (6) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

外傷（切傷、すり傷、つき傷）、靴ずれ

用法・用量

1日2～3回、患部に適量を塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法、用量を守って下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の治療を受けて下さい。
- (4) 本剤は外用のみに使用し、内服しないで下さい。

成分・分量

(100 g中)

成 分	含 量	は た ら き
アミノ安息香酸エチル	2.5 g	局所麻酔作用を有し、痛み、かゆみを鎮めます。
dl-塩酸メチルエフェドリン	0.1 g	皮膚内の血管を収縮させ、出血を止めます。
アクリノール	0.15 g	患部を殺菌し、消毒します。
酸化亜鉛	5.0 g	局所収れん作用を有し、皮膚を保護し、傷などの乾燥を早めます。
次没食子酸ビスマス	3.0 g	殺菌作用を有し、出血を止めます。
卵黄油	0.5 g	患部に栄養を与え、傷のなおいを早くします。

添加物として、バレイショデンプン、ミツロウ、ゴマ油、精製ラノリン、白色ワセリン、ユーカリ油を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社

電話 0598-37-2088

受付時間 AM 9:00～PM 6:00
(ただし、土、日、祝日を除きます。)

発売元

ベルベ薬品工業株式会社
大阪市城東区新喜多1丁目7番28号

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142