

この説明文書はご使用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるように、大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

あせも・かぶれ・ただれ

アセモタミー

一般に皮膚疾患においては、患部を乾燥させてさわやかな感じを保つと同時に、痛みやかゆみを抑えることが大切です。アセモタミーは消炎作用、抗アレルギー作用を有する酢酸ヒドロコルチゾンをはじめ、痛み・かゆみを抑えるアミノ安息香酸エチル、血行促進作用を有する酢酸トコフェロールを配合した軟膏です。また、基剤は患部を乾燥させる効果にすぐれ、汗や分泌物による不快感を除きます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師にご相談ください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

■成分・分量（100g中）

酢酸ヒドロコルチゾン	0.5g
アミノ安息香酸エチル	2.0g
酢酸トコフェロール	0.5g
酸化亜鉛	30.0g

添加物としてオリブ油、ゴマ油、卵黃油、白色ワセリン、サラシミツロウ、イソプロピルメチルフェノール、パレイシヨデンブ、香料を含有します。

■用法・用量

1日2～3回、適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

■効能・効果

あせも、かぶれ、ただれ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、じんましん、虫さされ、しもやけ

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。

○お問い合わせ先

六陽製薬株式会社 開発管理部

電話 (0798) 42-6940 (代表)

受付時間 月～金曜日 9:30～17:00 (祝祭日を除く)

発売元：日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
製造販売元：六陽製薬株式会社
兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-63