

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

皮膚軟化治療薬

モナリアクリーム


第3類医薬品

手肌のカサカサ、ザラザラを取りなめらかにする尿素配合クリーム


◆こんな症状にお使いください

- 手や肌が荒れてカサついたり、ザラザラする方に
- かかとが乾燥して、分厚く、硬くなっているような方へ
- ひじ・ひざ・くるぶしなどが黒ずんでカサカサするような方に
- さめ肌やカサカサ肌、お年寄りの乾燥肌に

上のような症状はドライスキンと呼ばれ、皮膚の角質層の水分が不足して起こります。健康な皮膚では、皮膚の中の水分がちょうど良い量を保っていますが、不足すると荒れて肌が硬くなり、カサカサ・ザラザラの肌になってしまいます。モナリアクリームに配合されている尿素は、天然保湿成分NMF(Natural Moisturizing Factor)のひとつで、角質の水分を保持する作用、また、古く、硬くなった角質を剥離に導く作用があり、グリチルリチン酸モノアンモニウムは、患部の炎症を修復しながら鎮め、トコフェロール酢酸エステルは末梢の血行を促して、皮膚表面に十分な酸素・栄養素を供給し、皮膚表面の新陳代謝が活発になり、すこやかでさらとなめらかな肌にしてくれます。また、基剤にも保湿効果のあるスクワランを配合しておりさっぱりとした使い心地です。水仕事の多い方、乾燥してつらい方はモナリアクリームで早めにお手入れしてください。



〈イメージ図〉



なめらかな皮膚へ



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目のまわり、粘膜等。
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂（ひび割れ）部位。
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4) 炎症部位（ただれ・赤くはれているところ）。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感（痛み、熱感、ぴりぴり感）、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部にのみ使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。

成分・分量

本製品 1g 中

成 分	分 量	は た ら き
尿 素	200mg (20.0%)	角質層に水分を取り込み保持する作用により、皮膚にしっとり感を与えます。また、乾燥してカサカサになった角質層表面をなめらかにします。
トコフェロール 酢酸エステル	5mg	末梢の血行を促して、皮膚表面に十分な酸素・栄養素の供給が促進されます。皮膚表面の新陳代謝が活発になり、すこやかな皮膚が生まれます。
グリチルリチン酸 モノアンモニウム	5mg	患部の炎症を修復しながら鎮めます。

添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、グリセリン、プロピレングリコール、パラベン、ステアリルアルコール、セタノール、パラフィン、流動パラフィン、カルボキシビニルポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、トリエタノールアミンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。



本品についてのお問い合わせは

お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00～17:00

（ただし、土、日、祝祭日は除きます。）

発売元 小林薬品工業株式会社

東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

製造販売元 万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142