

使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

デリケートS

〔販売名〕 ラウマーS

非ステロイド剤

第2類医薬品

<鎮痒消炎剤>

■製品の特長

デリケートSは、有効成分のはたらきにより患部を殺菌し、下記の不快な症状を改善します。

①おりものによるかゆみ

日本人の食生活が洋風化することで、体内分泌物が変化しています。このためにおりものが増加する傾向があります。

②生理時のかゆみ

生理時の経血には陰部の細胞や粘膜が混じっています。これらが雑菌の繁殖する原因となりかゆみや炎症を起こします。

③下着のかぶれ

ナイロン製のストッキングや下着のしめつけにより通気性が悪くなりかぶれやかゆみが生じやすくなっています。

④陰部周辺部のかゆみ

生理中や妊娠時、からだの抵抗力が弱くなっている時は、陰部の自浄作用が弱くなりかゆみが起こりやすくなります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないでください。

目や目のまわり、口唇



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 乳幼児
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 患部の湿潤やただれのひどい人

2. 次の場合は、ただちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ

- (2) 数日間使用しても症状の改善がみられない場合

裏面もお読みください。

【効能・効果】

かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ

【用法・用量】

1日数回、患部に適量を塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診断を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)同じ部位に他の外用剤との併用は避けてください。

【成分・分量】

成分	100g中	はたらき
リドカイン	2.0g	局所を麻酔してかゆみを抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	新陳代謝を促し、治療を促進します。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	抗ヒスタミン作用でかゆみの発生を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌効果で雑菌の繁殖を抑えます。

添加物として、モノステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、ステアリルアルコール、セタノール、プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、セバシン酸ジエチル、トリエタノールアミンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- (2)小児の手の届かないところに保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

ご注意 カンジダ症、トリコモナス症などの原因によるかゆみは、医師による根本治療が必要です。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社

電話 0598-37-2088

受付時間 AM10:00～PM5:00

(ただし、土、日、祝日を除きます。)

発売元



日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142

C2008