

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるように大切に保管してください。

吉草酸酢酸プレドニゾン配合

リナ α クリーム (皮膚疾患治療薬)

医薬品

水仕事などによって、手荒れ、乾燥肌状態になると、皮脂によるバリア機能が弱くなり、外部からの刺激や有害菌などが皮膚の内部にまで入り込んでしまい、湿疹やかゆみの原因となります。さらにそれを掻(か)いてしまうと、さらに角質が荒れるという悪循環を生んで症状を悪くしてしまいます。リナ α クリームの主成分である吉草酸酢酸プレドニゾンは、アンテドラッグという新しいタイプのステロイド剤で、その高い消炎効果と、同時に配合された3成分の働きによって、湿疹、皮膚炎、かゆみなどを鎮めます。

アンテドラッグとは…皮膚表面の患部で優れた効果を発揮したのち、体内に吸収されると作用の弱い物質に分解されるという、有効性と安全性の両立を目的として開発された薬剤です。

また、本品は低刺激性のクリームで、よくのびてベタつかない、さっぱりとした使用感です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
- (2) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等

2. 顔面には広範囲に使用しないでください。

3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 患部が広範囲の人。
- (6) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、ただちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

裏面もお読みください。

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状の重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5)本剤の使用後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。

【成分・分量・はたらき】（1g中）

成分	1g中	はたらき
吉草酸酢酸ブレドニゾロン	1.5mg	高い消炎作用により、湿疹・皮膚炎等の炎症を抑えます。
クロタミトン	50mg	湿疹・かぶれ等に伴うかゆみを抑えます。
酢酸トコフェロール	5mg	血行を促進し、治療を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	1mg	殺菌効果により、患部の感染を防ぎます。

添加物として、ステアリルアルコール・セタノール・トリエタノールアミン・パラベン・プロピレングリコール・ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油・ポリソルベート60・カルボキシビニルポリマー・セバシン酸ジエチルを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。（品質保持のため）

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いします。

万協製薬株式会社

電話0598-37-2088 受付時間AM10:00～PM5:00（ただし、土、日、祝日を除きます。）



発売元 **ゼネラル** 薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号

製造 万協製薬株式会社
販売元 三重県多気郡多気町五桂1169-142