

ラウマーFE液

第2類医薬品

ご使用に際して、この添付文書を
必ずお読みください。
又、必要な時に読めるように大切に
に保管してください。



ラウマーFE液は、痛みやはれのもとに直接作用するフェルビナクを3.0%配合した非ステロイド系の鎮痛消炎薬です。

フェルビナクが痛みの発生に関与するプロスタグランジンの生成を抑制して肩・腰・関節・筋肉の痛みにすぐれた効き目をあらわします。背中や腰などの手の届きにくいところにもぬりやすい容器形状で、痛みの強い患部にもやさしく塗れます。

ℓ-メントール3.0%配合により、塗布後心地よい清涼感があります。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜など。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口、又は化膿している患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人。



2. 次の場合は、ただちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用中又は使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれなど

- (2) 1週間くらい使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

○肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手、手首、足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】1日2～4回、適量を患部に塗布してください。

（用法・用量に関連する注意）

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 薬剤塗布後の患部をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないでください。




【成分・分量とその主な作用】（100mL中）

成分	分量	主な作用
フェルビナク	3.0g	非ステロイド系の鎮痛消炎成分で、痛みやはれを鎮めます。
ℓ-メントール	3.0g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。

添加物としてBHT、エタノール、クエン酸、ジソプロパノールアミン、マクロゴール、グリチルレチン酸、ヒプロメロースを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して立てて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかりとめてください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり、品質が変わる恐れがあります。）
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) 火の中に投じないでください。
- (7) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (8) メガネ、時計、アクセサリなどの金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面などに付着すると変質することがあるので、付着しないように注意してください。
- (9) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。

万協製薬株式会社 電話0598-37-2088 受付時間AM10:00～PM5:00（ただし、土・日・祝日を除きます。）

発売元

hoyu

ホーユー株式会社
名古屋市東区徳川一丁目501

製造
販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142